


TECHNIQUE D'INJECTION POUR LES BOVINS




INTRAMUSCULAIRE

Toutes les injections intramusculaires doivent être données dans les muscles du cou derrière la base de l'oreille et avant la pointe de l'épaule. Utiliser une aiguille de 1 – 1 1/2 pouce de longueur et de calibre 16 ou 18.



SOUS-CUTANÉE

Afin de minimiser les dommages à la carcasse, insérer l'aiguille dans un repli de la peau, tel qu'illustré, dans le cou en avant de l'épaule. Utiliser une aiguille de 1 pouce de longueur et de calibre 16 ou 18.



Utiliser l'aiguille appropriée selon le type d'injection et la grosseur de l'animal

À propos des injections :

- ✓ Bien lire l'étiquette du produit.
- ✓ Respecter la période de retrait.
- ✓ Consulter un vétérinaire sur le bon usage des médicaments.
- ✓ Si votre vétérinaire vous recommande une dose ou une administration différentes de l'étiquette, la période de retrait peut changer.

Si une aiguille se brise :

- ✓ Identifier l'animal immédiatement.
- ✓ Essayer de retrouver l'aiguille brisée.
- ✓ Si elle ne peut être retrouvée, marquer l'animal de façon permanente.
- ✓ Inscrire une note à ce sujet dans votre registre.
- ✓ Avertir l'abattoir avant le transport pour que l'animal soit manipulé séparément.

Injecter un petit volume par site : pas plus de 10 ml (cc) maximum par site

Au moment de piquer :

- ✓ Ne pas piquer dans la hanche ou la cuisse.
- ✓ Ne pas piquer une peau sale.
- ✓ Injecter un petit volume par site : pas plus de 10 ml.
- ✓ Changer l'aiguille à toutes les 10 – 15 injections.
- ✓ Changer l'aiguille lorsqu'elle est pliée, émoussée ou contaminée avec du fumier.
- ✓ Ne pas redresser une aiguille ou réutiliser une aiguille pliée.
- ✓ Nettoyer les aiguilles et seringues avec de l'eau chaude entre les usages.
- ✓ Si un désinfectant est utilisé pour nettoyer les aiguilles et seringues, bien rincer avant la prochaine utilisation.

L'entreposage des médicaments :

- ✓ Ne pas remettre une aiguille dans une bouteille après utilisation.
- ✓ Entreposer les médicaments dans une armoire propre ou un réfrigérateur (voir l'étiquette).
- ✓ Vérifier que la température du réfrigérateur soit entre 2 et 7 °C.
- ✓ Ne pas entreposer des médicaments avec des aiguilles dans le bouchon.
- ✓ Vérifier souvent les dates d'expiration et disposer des médicaments périmés auprès de votre vétérinaire.
- ✓ Disposer des médicaments qui ont changé d'apparence (couleur et épaisseur).

Canadian Cattlemen
Quality Starts Here

